



RODAMED

Centrum Diagnostyki Obrazowej i
Lekarzy Specjalistów

62-700 Turek

ul. Korytkowska 1

biuro@rodamed.pl

tel. 663-960-193

KWESTIONARIUSZ PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

PRZECIWWSKAZANIA DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

- Bezwzględny przeciwwskazaniem jest ciąża, szczególnie jej pierwszy trymestr. Pacjentki karmiące piersią nie powinny karmić 24h po badaniu.
- Względny przeciwwskazaniem są niewydolność lub upośledzona funkcja nerek.
- Z uwagi na wykorzystywanie w obrazowaniu promieniowania jonizującego zastosowanie TK w badaniach dzieci wymaga uzasadnionych wskazań.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ:

DOTYCZT KOBIET:

POINFORMOWAĆ PERSONEL MEDYCZNY O EWENTUALNEJ CIĄŻY. W PRZYPADKU KOBIET W WIEKU ROZRODCZYM WYMAGANY JEST AKTUALNY TEST CIĄŻOWY.

Tomografia komputerowa może być wykonana w każdej fazie cyklu miesięczkowego, także w trakcie miesiączki. Zaleca się wykonanie badania do 10 dnia cyklu.

1. Przez 5 godzin przed badaniem nie należy przyjmować pokarmów stałych, nie palić. Na 2 godziny przed badaniem należy wypić 1 litr wody niegazowanej. W przypadku tomografii komputerowej jamy brzusznej na badanie należy przynieść 1,5 litra niegazowanej wody mineralnej. Pacjent zaczyna pić wodę DOPIERO w gabinecie. Zatem pacjent zgłaszający się na badanie TK jamy brzusznej i/ lub miednicy powinien być świadomy czasu oczekiwania.

2. Podczas tomografii zaleca się luźne wygodne ubranie pozbawione metalowych elementów (nity, guziki, biżuteria ,zamki, klamry pasków). Zdjąć spinki do włosów ,okulary, aparaty słuchowe, niestałe protezy zębowe. Wszelkich informacji w tej kwestii udziela osoba wykonująca badanie, ponieważ nie do każdego badania pacjent jest tak samo przygotowywany.

3. W przypadku badania z podaniem kontrastu dożylnego konieczne jest wykonanie badania poziomu kreatyniny we krwi. Wynik powinien być aktualny i mieścić się w granicach normy. Jeśli wynik odbiega od normy, skontaktować się z lekarzem rodzinnym. Wyniki w /w testu okazać personelowi medycznemu przed wykonaniem tomografii. Nie dotyczy to pacjentów ze skierowaniami na TK kręgosłupa, HRCT ,kości skroniowych oraz zatok (chyba, że lekarz kierujący wyraźnie prosi o badanie z kontrastem). Pozostali pacjenci powinni zgłaszać się na badanie poziomu kreatyniny (istnieje możliwość wykonania badania na terenie placówki). Jest to istotne w przypadku podania środka cieniującego (kontrastu) dożylnie do pełnej diagnostyki.

4. Pacjenci z niewydolnością nerek, nadczynnością oraz niedoczynnością tarczycy powinni przed zarejestrowaniem się skontaktować się z pracownią tomografii komputerowej !. Jeżeli poziom kreatyniny jest powyżej 2- nie wykonujemy badań z kontrastem bez wyraźnej zgody nefrologa.
5. W przypadku badania z kontrastem należy zaprzestania stosowania METAFORMINY (lek stosowany u cukrzyków) na 2 doby przed badaniem, poinformować swojego lekarza diabetologa o zaleceniu wykonania w/w badania przez innego specjalistę. Inne leki powinny zostać zażyte tak jak zwykle .Pacjenci powinni znać dawki i nazwy przyjmowanych leków lub posiadać ich spis. Jest to bardzo istotne w przypadku badań z podaniem środka cieniującego.
6. W przypadku chorób tarczycy wymagana jest zgoda endokrynologa na podanie kontrast.
7. Prosimy o przyniesienie i przekazanie do wglądu posiadanej dokumentacji medycznej np. kart wypisowych leczenia szpitalnego, opisów poprzednio wykonanych badań TK z płytami CD oraz wyniki RTG.
8. Osoby wymagające okularów do czytania proszone są o zabranie ich ze sobą.
9. Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.
10. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań można dzwonić do placówki RODAMED na podany wyżej numer telefony lub e-mail.

W CZASIE BADANIA:

1. Podczas badania pacjent ma stały kontakt z personelem medycznym za pośrednictwem intercomu (system telewizyjny do obserwacji pacjenta).
2. Pacjent powinien natychmiast zgłaszać wystąpienie nagłych dolegliwości tj. duszność, zawroty głowy, nudności, uczucie gorąca, metaliczny smak w ustach, kołatanie serca, uczucie klaustrofobii.

PO BADANIU:

1. Jeśli podczas badania został podany środek kontrastowy to w celu jego eliminacji z organizmu konieczne jest w ciągu 24 godzin spożycie około 2,5 litra wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych.
2. W rzadkich przypadkach po podaniu środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy świąd, zawroty głowy, uczucie gorąca, metaliczny posmak, kołatanie serca. W razie wystąpienia powyższych lub innych niepokojących objawów wskazana jest jak najszybsza konsultacja lekarska.

Pacjent 30 minut po badaniu przebywa na terenie placówki ,w celu wnikliwej obserwacji przez personel medyczny(wykluczenie ewentualnych następstw po podaniu kontrastu).

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety

Imię i nazwisko pacjenta..... wiek waga.....
 Data..... nr. badania

Czy jest pani w ciąży?	TAK	NIE	NIEWIEM
Czy występowały lub występują u Pana / Pani poniższe choroby lub uczulenia:			
Choroby tarczycy	TAK	NIE	Treść kwestionariusza jest dla mnie zrozumiała, a zaznaczone odpowiedzi są zgodne ze stanem faktycznym. data, podpis pacjenta
Choroby nerek	TAK	NIE	
Cukrzyca	TAK	NIE	
Astma lub POCHP	TAK	NIE	
Nadciśnienie tętnicze	TAK	NIE	
Reakcja uczuleniowa na leki lub po podaniu dożylnego środka kontrastowego	TAK	NIE	

POWIKŁANIA I REAKCJE NIEPOŻADANE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PO PODANIU ŚRODKA CIENIUJĄCEGO:

WCZESNE .>do 1 godziny po podaniu (bardzo rzadko):

wynacznienie środka cieniującego poza naczynie krwionośne, nudności, wymioty, uderzenie ciepła, uderzenie gorąca, pokrzywka, - zmiany skórne w postaci wypukłych swędzących białych bąbli (generalnie w zakresie twarzy, szyi i klatki piersiowej),kichanie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, uogólniona pokrzywka lub rumień, obrzęk płuc ,obrzęk krtani ,skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca(częstość występowania bardzo poważnych objawów ze stanem zagrożenia życia lub śmiercią wynosi ok. 0,1%).

OPÓŹNIONE >od 1 do 7 dni po podaniu (rzadko):

Wysypka, świąd, obrzęk, bóle i zawroty głowy „nudności, biegunka, dreszcze, skurcze mięśni ,objawy grypopodobne, nefropatia- zaburzenie czynności nerek występujące w ciągu 3 dni po podaniu środka cieniującego, przebiegające z podwyższonym poziomem kreatyniny we krwi.

BARDZO PÓŹNE > powyżej 7 dni po podaniu (bardzo rzadko)

Nadczynność tarczycy

Wystąpienie któregokolwiek z powyższych należy natychmiast zgłosić personelowi medycznemu.